

Primena protokola kompleksa protiv- akni

Za tretman akni, doktor može primeniti jednu ili drugu tehniku (površinske intradermalne Papule) u svakoj tački koja ima akne i unutrašnja epidermalna površinska Nappage.

ZA PODRUČJE NEAKTIVNO AKNAMA

Injekciona Tehnika: Unutrašnja epidermalna površinska Nappage
Injekciona Dubina: <1mm
Injekciona količina: 0.01 cc po ubodu
Injekcioni razmak: 0.2-0.5 cm
Igla: 30G 4-12mm
Sesije tretmana: 4 nedeljna sesija 2 sesije (svakih 15 dana)
Održavanje: 4 sesije (mesečno)

ZA PODRUČJE AKTIVNO AKNAMA

Injekciona Tehnika: Površinski intradermalne Papule
Injekciona Dubina: 1-2mm
Injekciona količina: 0.1 - 0.2cc po tački
Injekcioni razmak: jedan ili dva uboda po aktivnom delu
Igla: 30G 4-12mm
Sesija Tretmana: 4 nedeljna sesija 2 sesije (svakih 15 dana)
Održavanje: 4 sesije (mesečno)

Preventivne mere

Primena tretmana može biti praćena trenutnim blagim crvenilom i peckanjem koji brzo nestaje.

Doktor mora biti oprezan sa epidermalnom tehnikom ove vrste tretmana, jer agresivna primena može da izazove ožiljke posle upale.

Preporučuje se nedelju dana pre mezoterapije primena hemijskog pilinga kako bi se nežno uklonile mrtve ćelije kože i poboljšala propustljivost kože i penetracija aktivnih sastojaka.

Ne primenjivati Radiotalase ili bilo koji toplotni tretman na tretirano područje najmanje jednu nedelju pre tretmana mezoterapije ili jednu nedelju posle.

Materijal potreban za tretman Mezoterapije

- Špric za jednokratnu upotrebu (1 ml - 3 ml) zavisno od količine proizvoda za primenu
- Jednokratne igle za mezoterapiju (30 G) – 4mm-12mm dužine
- Jednokratne igle za izvlačenje
- Višestruki špricevi
- Ručni ili automatski pištolji (špricevi)
- Ostali sterilni jednokratni materijal: rukavice, gaza, peškir za ležaj, sterilna posuda.

Ručna primena

Ručna primena je najjednostavnija i preporučuje se obučenom terapeutu. Uspeh se zasniva na kombinaciji špriceva i igala da bi se sadržao potreban broj injekcija.

Mehanička oprema

Difuzija i primena su sporiji kroz mezo trakt nego preko ostalih parenteralnih traktova. Difuzija ne zavisi od mesta anatomskih punkcija već od savršene tehnike izvođenja mezo tehnike.

Brzina difuzije je obrnuto proporcionalna molekularnoj težini upotrebljenog leka.

Mala količina leka ubrizgava se u mnogo tačaka.

PRE TRETMANA:

- Mezoterapija je medicinska tehnika. Ključno je da se postavi tačna medicinska dijagnoza kako bi se postigli najbolji mogući rezultati za klijenta. Imperativ u donošenju odluke je upotreba ispravnih lekova.
- Istorija klijenta i tačna dijagnoza kože.
- Plan tretmana, ciljevi, broj sesija i intervali.
- Potpisan obrazac saglasnosti.
- Preporuke klijentu pre tretmana: pravilno čišćenje kože od šminke, kreme ili losioni. 48 sati pre tretmana izbegavati lekove za razređivanje krvi.

Faza 1: Primena lokalnog anestetika

Naneti lokalnu anestetik kremu na lice, vrat i dekolte kod osetljivih klijenata (30-60 minuta pre procedure). Alternativno, klijent može kremu naneti kod kuće sat vremena pre postupka. Ovaj korak će poboljšati komfor klijentu, posebno ukoliko lekar nije iskusan u tehnici mezoterapije. Sa više iskustva, možda ovaj korak više nije potreban.

Napomena: ovaj proizvod može biti pomešan sa 1/3 dela Procaine.

Faza 2: Antiseptik

Očistite kožu uklanjajući sve tragove kreme ili šminke. Očistiti tretiranu regiju sa Chlorhexidine pomešanim u vodi. Naneti traku za kosu ili kapu klijentu kako bi se sklonila kosa sa regije koja se tretira.

Pripremiti posudu sa gazom, proizvode koji se koriste, špriceve, igle i sterilne rukavice.

Tretman se primenjuje dok klijent leži. Izabrati najbolji položaj za klijenta za vreme aplikacije, koji mora biti pod pravim uglom.

Proceniti lokaciju krvnih sudova kako bi se izbegli hematoma.

Faza 3:


Za područje neaktivno aknama: unutrašnja epidermalna površinska NAPPAGE

Početi ubruzgavanje sastojaka u područje koje će se tretirati.

Sastoji se od ručnog izvođenja niza više površinskih ubrizgavanja razmaka 2-4 mm, uz kontinuirano održavanje regularnog i konstantnog pritiska na klip šprica. Igla se ubacuje pod uglom od 30° do 60° i na dubini manjoj od 1 mm. Ovo je prednost jer izaziva minimalno ili nikakvo krvarenje.

Nappage je relativno bezbolna tehnika koja omogućava dobru stimulaciju kože. Posebno je pogodan za velike površine, za klijente osetljive na bol i za osetljiva područja poput lica.

Igle: 30-32G 4-12mm nagib gore. Ali samo kosi deo ide u kožu.




Za područje aktivno aknama: Površinski intradermalne PAPULE

Započeti ubrizgavanje sastojaka u područje koje će se tretirati.

Ova tehnika se može izvesti na celom području koje se tretira ili fokusirati na problematičnu regiju. Jedan špric od 1 ml sa 30G iglom od 4-12mm se može koristiti za ovu tehniku. Nagib igle je ponovo nagore kako bi se koža blanširala i nastala papula.

Tehnika ubruzgavanja nalazi se u intra- bazalnom sloju: karakteriše više papula. Ubrizgava se u 1-2 mm dubine sa 0.04-0.05 ml po ubodu. Male papule vidljive su po celoj površini kože, posebno preko problematičnih područja.



Faza 4: Očistiti tretiranu regiju

Regija se sada čisti mokrom gazom kako bi se uklonile male tačkice krvi sa tog područja.

Faza 5: Naneti kremu nakon injekcije

Na kraju procedure naneti kremu posle injekcija koja smiruje kožu, uklanja iritaciju ili crvenilo. Ovo nanošenje će omogućiti da klijent napusti ordinaciju/ salon bez ikakvih znakova uboda.

Faza 6: Zakazati sledeći tretman

Zakazati sledeći tretman i dati klijentu smernice o predloženom toku tretmana.