

# PROTOKOL MEZOTERAPIJE ZA ROSACEA

Za tretman rozacee, doktor će naneti koktel kroz unutrašnju epidermalnu površinsku Nappage tehniku na zahvaćeno područje.

<b>Injekciona Tehnika:</b> Unutrašnja epidermalna površinska Nappage
<b>Injekciona Dubina:</b> <1mm
<b>Injekciona količina:</b> 0.01 cc po ubodu
<b>Injekcioni razmak:</b> 0.2-0.5 cm
<b>Igla:</b> 30G 4-12mm
<b>Sesije Tretmana:</b> 4 nedeljna sesija 2 sesije (svakih 15 dana)
Održavanje: 4 sesija (mesečno)

## Preventivne mere

Primena tretmana može biti praćena trenutnim blagim crvenilom i peckanjem koji brzo nestaje.

Doktor mora biti oprezan sa epidermalnom tehnikom ove vrste tretmana, jer agresivna primena može da izazove ožiljke posle upale.

Ne primenjivati Radiotalase ili bilo koji toplotni tretman na tretirano područje najmanje jednu nedelju pre tretmana mezoterapije ili jednu nedelju posle.

## POTREBAN MATERIJAL

Pre početka postupka mezoterapije, pripremiti ležaj i potreban material za tretman:

- Mezokokteli
- Špric za jednokratnu upotrebu (1-3 ml) zavisno od količine proizvoda za primenu
- Jednokratne igle za mezoterapiju (30-32 G) 4-12mm dužine
- Jednokratne izle sa izvlačenje koktela (18-21G)
- Ostale sterilne jednokratne potrepštine kao što su rukavice, gaza, peškir za ležaj, sterilna posuda
- Anestetik krema
- Antiseptični rastvor za kožu (Chlorhexidine)

### PRE TRETMANA:

- Mezoterapija je medicinska tehnika. Ključno je da se postavi tačna medicinska dijagnoza kako bi se postigli najbolji mogući rezultati za klijenta. Imperativ u donošenju odluke je upotreba ispravnih lekova.
- Istorija klijenta i tačna dijagnoza kože.
- Plan tretmana, ciljevi, broj sesija i intervali.
- Potpisan obrazac saglasnosti.
- Preporuke klijentu pre tretmana: pravilno čišćenje kože od šminke, kreme ili losioni. 48 sati pre tretmana izbegavati lekove za razređivanje krvi.

### PROTOKOL TRETMANA

- Pre tretmana mezoterapije, neophodno je kompletna procena i upitnik medicinske istorije, upisati kompletnu anemnezu kože klijenta. Ne tretirati ni jednog klijenta koji je medicinski ugrožen od bilo koje medicinske kontraindikacije (aktivni kancer, dijabetes zavisian od insulina, bolest jetre ili bubrega, HIV, aktivne infekcije kože na tretiranim područjima, srčani problemi ili korišćenje povezanih lekova, poput antikoagulansa, istorija ožiljaka, trudnoća ili dojenje, aktivni plikovi od herpes simpleksa ili prehlade).
- Nakon prolaska medicinskog pregleda klijent će u potpunosti biti informisan o rizicima, prednostima i potencijalnim neželjenim reakcijama i to će potvrditi potpisom.
- Naneti traku za glavu ili kapu pacijentu kako bi držala kosu van tretirane regije.
- Ukloniti šminku sa kože.
- 30 minuta pre tretmana, preporučljivo je naneti lokalnu anestetik kremu na regiju koja će se tretirati kako bi se smanjila neprijatnost na koži. Naneti četkom anestetik kremu na regiju koja će se tretirati i prekriti plastičnom folijom.
- Očistiti kožu uklanjanjem svih tragova anestetik kreme. Dezinfikovati regiju koja će se tretirati sa antiseptičnim rastvorom.
- Tretman se mora sprovoditi dok klijent leži. Izabrati najbolji položaj za klijenta za vreme aplikacije, koji mora biti pod pravim uglom.
- Proceniti lokaciju krvnih sudova kako bi se izbegli hematoma.
- Početi sa ubrizgavanjem sastojaka mezo- koktela za Rosacea u regiju koja se tretira.

Naneti mezo- koktel za problem Rosacea uz pomoć **UNUTRAŠNJE EPIDERMALNE POVRŠINSKE NAPPAGE TEHNIKE.**

### **UNUTRAŠNJA EPIDERMALNA POVRŠINSKA NAPPAGE TEHNIKA.**

Za površinsku nappage tehniku, preporučuje se upotreba igle sa obeležjem 30-32G, 4-13 mm dužine.

Površinski unutrašnje-epidermalni nappage podrazumeva nanošenja proizvoda u epiderm, na dubini manjoj od 1 mm. Proizvod odložen na površinu ostaje u kontaktu sa epidermom 3 do 5 minuta kako bi se pomoglo njegovo prodiranje.

Nappage je relativno bezbolna tehnika koja omogućava dobru stimulaciju kože. Posebno je pogodan za velike površine, za klijente osetljive na bol i osetljive predele lica.

- Očistiti regiju.